日仏海洋学会
Société franco-japonaise
d'Océanographie

Session 2 « Vers des activités de pêche et d'aquaculture durables »

Changements à long-terme d'un socio-écosystème côtier à vocation conchylicole (Lagune de Thau, France) : mise en évidence de changements de régime et perception des habitants

Valérie Derolez, Rémi Mongruel, Hélène Rey-Valette, Nicole Lautrédou-Audouy

© FredP, Shutterstock

Amure
CENTRE DE DROIT ET D'ÉCONOMIE DE LA MER

CENTER FOR ENVIRONMENTAL
ECONOMICS - MONTPELLIER

Contexte : la lagune de Thau

Support de nombreux services écosystémiques...

**Loisirs
Nautiques**
24 ports
10 clubs plongée

Pêche
~100 pêcheurs
500 emplois

**Protections
environnementales**
Natura 2000

Thermalisme
45 000 curistes/an

Conchyliculture
8 000 tonnes/an
450 exploitants
2000 emplois

Contexte : la lagune de Thau

Support de nombreux services écosystémiques... très liés à la qualité de l'eau

Loisirs Nautiques
24 ports
10 clubs plongée

Pêche
~100 pêcheurs
500 emplois

Thermalisme
45 000 curistes/an

Conchyliculture
8 000 tonnes/an
450 exploitants
2000 emplois

Protections environnementales
Natura 2000

Contexte : la lagune de Thau

Support de nombreux services écosystémiques... très liés à la qualité de l'eau

Loisirs Nautiques
24 ports
10 clubs plongée

Pêche
~100 pêcheurs
500 emplois

Thermalisme
45 000 curistes/an

Conchyliculture
8 000 tonnes/an
450 exploitants
2000 emplois

Protections environnementales
Natura 2000

Objectifs et Méthodes

Le socio-écosystème (SES) étudié sur le long terme (1970-2018) pour :

1. Analyser sa trajectoire : mettre en évidence des synchronicités, des « changements de régime » et des périodes contrastées (Norgaard 1995; Biggs *et al.* 2018)
2. Etudier la perception des changements par les habitants

➔ Approche interdisciplinaire associant Sciences du Vivant et Sciences Humaines et Sociales

Objectifs et Méthodes

Le socio-écosystème (SES) étudié sur le long terme (1970-2018) pour :

1. Analyser sa trajectoire : mettre en évidence des synchronicités, des « changements de régime » et des périodes contrastées
2. Etudier la perception des changements par les habitants

Regional Environmental Change (2023) 23:68
<https://doi.org/10.1007/s10113-023-02061-y>

ORIGINAL ARTICLE

Trajectory of a coastal social-ecological system: analyzing co-evolution and regime shifts in the Thau lagoon (Mediterranean Sea, France), 1970–2018

Valérie Derolez¹ · Rémi Mongruel² · Hélène Rey-Valette³ · Nicole Lautrédou-Audouy³

Objectifs et Méthodes

Le socio-écosystème (SES) étudié sur le long terme (1970-2018) pour :

1. Analyser sa trajectoire : mettre en évidence des synchronicités, des « changements de régime » et des périodes contrastées (Norgaard 1995; Biggs *et al.* 2018)
2. **Etudier la perception des changements par les habitants**

Enquête auprès de 476 habitants :

- 4 communes interrogées (été 2021)
 - 55% en face à face, 45% en ligne
 - 58 ans en moyenne
- **Perception des rôles (8 services écosystémiques) actuels et passés de la lagune**

	Quel est le type d'évolution				
Importance actuelle (note de 0 à 10)	Croissant	Décroissant	Quasi-stable	Très fluctuant	Importance passée (note de 0 à 10)

Contents lists available at [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com)
Ocean and Coastal Management
journal homepage: www.elsevier.com/locate/ococoaman

How do coastal residents perceive past and future changes in a Mediterranean lagoon ecosystem services?

Valérie Derolez^{a,*}, Rémi Mongruel^b, Fériel Adjeroud^c, Hélène Rey-Valette^c, Dorian Nicolle^d, Nicole Lautrédou-Audouy^c

Résultats 1 La trajectoire du SES est marquée par une succession de crises

Crise dystrophique (malaïgue)

Epizootie de coquillages

Résultats 1 La trajectoire du SES est marquée par une succession de crises

Crise dystrophique (malaïgue)
Epizootie de coquillages

Disparition des huîtres plates
~1990

Mortalités naissains d'huîtres (OshV-1)
2008

Crise des eaux vertes (Picochlorum)
2018-2019

Plusieurs événements sont des jalons selon les acteurs $\geq 3/9$; $\geq 5/9$

Fermeture ou crise sanitaire (microbiologie)
Fermeture/crise sanitaire (phyto toxique)

Crise de la salmonelle
1989

Alexandrium
1998

Classement sanitaire B
2004

Sectorisation sanitaire
2018

Résultats 1 Les séries temporelles illustrent des évolutions synchrones

Driver
Pression
 State (état)
 Impact (usages)
 Réponse (gestion)

↗ production primaire (Chl-*a*)
 ↗ production conchylicole

↗ population non raccordée à l'assainissement
 ↗ phosphates dans l'eau
 ↗ pêcheurs

↗ température
 ↗ population
 ↗ associations culturelles & récréatives
 ↗ capacité touristique
 ↗ habitats protégés
 ↗ outils de gestion
 ↗ publications scientifiques

➔ 3 groupes d'années aux caractéristiques contrastées

Résultats ① Des ruptures identifiées par la combinaison des 2 approches

2 périodes de crises environnementales → réorganisation des stratégies des acteurs

→ 3 groupes d'années aux caractéristiques contrastées

Résultats ① Des ruptures identifiées par la combinaison des 2 approches

2 périodes de crises environnementales → réorganisation des stratégies des acteurs

→ 3 groupes d'années aux caractéristiques contrastées

Résultats 2 La population a une bonne connaissance des rôles de la lagune

- Relative **bonne connaissance** des habitants (différence moyenne de 1,9/10)

Détail des rôles de la lagune		Habitants	Experts et scientifiques
Approvisionnement	Production de coquillages (huîtres et moules)	8	7
	Pêche (poissons et coquillages)	5,9	3,2
	Flore, de la faune et de la biodiversité aquatique	7,8	6,4
Régulation	Richesse nutritive et chaînes alimentaires	7,6	7,2
	Régulation de la qualité de l'eau	7,8	6,9
Culturels	Activités récréatives et sportives	7	6,8
	Paysages, balade et observation de la nature	7,9	6,6
	Contribution à la culture et au patrimoine	7,6	8

Meilleure connaissance

- Des **différences dans les tendances** de plusieurs services écosystémiques (conchyliculture, biodiversité, richesse nutritive) → **liées à des biais cognitifs (jugement, ancrage) ?**

- Niveau de connaissance **influencé par les facteurs socio-démographiques** :

Moindre connaissance

- hommes
- habitants de Mèze (+ conchyliculture)
- niveau d'éducation plus élevé
- connexion à la nature

Meilleure connaissance

- résidents de longue date
- plus forts revenus
- plus fort engagement vis-à-vis de la protection de l'environnement

Résultats 2 La population a une bonne connaissance des rôles de la lagune

- Les habitants ont majoritairement une perception diversifiée des services structurants

Conclusions et perspectives

- **Intérêts d'une approche interdisciplinaire et combinée pour mettre en évidence :**
 - **des phases de ruptures** : interactions entre crises environnementales et adaptations du système de gestion
 - **des changements dans la consommation de services écosystémiques (SE)** : $\searrow$ des SE de production vs $\nearrow$ des SE culturels (cf. Inacio *et al.* 2018 ; Erostate *et al.* 2022 ; Ligorini *et al.* 2022)
 - **Bon niveau de connaissance des habitants** : atout pour l'appropriation des politiques de conservation
 - **Perspectives**
 - Comparaison flux/demandes/potentiel de SE $\rightarrow$ seuils critiques, impacts (Mongruel *et al.* 2018)
 - Comparaison des trajectoires de 3 socio-écosystèmes conchylicoles français :
 - Capacité d'adaptation des conchyliculteurs (3 enquêtes)
 - Analyse en dynamique des systèmes pour mettre en évidence des périodes de stabilité/instabilité ; des boucles de rétroactions +/- efficaces
- $\rightarrow$ Identification de conditions pour augmenter la résilience des SES côtiers, soumis à de multiples usages et pressions ?**

Retroscope